



Principio Activo

Crisantaspasa

Marca

ENRYLAZE. Solución para perfusión 10 mg de crisantaspasa (L-asparaginasa de *Erwinia chrysanthemi*)

Clase

Derivados de L-Asparaginasa Inhibidores síntesis DNA

Indicación

LLA y LLB en adultos y pediátricos (a partir de 1 mes) que han desarrollado hipersensibilidad o inactivación silente a la asparaginasa derivada de *E. coli* como parte de un régimen multi tt°.

Dosis

Cada 48 horas: 25 mg/m² IM ó IV
o
L-X-V:
-25 mg/m² IM lunes y miércoles y 50 mg/m² IM el viernes.
-25 mg/m² IV lunes y miércoles y 50 mg/m² IM el viernes.
- 25 mg/m² IV lunes y miércoles y 50 mg/m² IV el viernes.

Dosis Renal

No hay recomendaciones de ajuste de dosis ni en FT ni en IPT.

Nefrotoxicidad

Similar a L- Asparaginasa (es una asparaginasa recombinante, consultar esta)
-Pancreatitis aguda o crónica. Hiperglucemia 2ª.
Cetoacidosis.
-Disminución de síntesis de proteínas hepáticas.
Hipoalbuminemia. Edemas.
-LRA, deterioro renal sobre ERC previa.
Nefropatía por acd. Úrico.
-Proteinuria.
-Hipo e HTA.
-Vómitos y diarrea.
-Por su actividad glutaminasa, disminuye los niveles de glutamina y aumenta la producción de amoníaco.

Plan