



Principio Activo

Ivosidenib

Marca

TIBSOVO 250 mg cmp

Clase

Inhibidores de isocitrato deshidrogenasa (IDH1).

Indicación

-En combinación con azacitidina: LMA de nuevo diagnóstico con mutación de la isocitrato deshidrogenasa-1 (IDH1) R132, no candidatos a QT de inducción estándar -En monoterapia en colangiocarcinoma localmente avanzado o metastásico con mutación IDH1 R132 que hayan recibido al menos una línea previa de ttº sistémico.

Dosis

-LMA: 500 mg/día VO, en combinación con azacitidina a 75 mg/m²/día IV ó SC los días 1 a 7 de cada ciclo de 28 d.
Colangiocarcinoma: 500 mg/día VO.

Dosis Renal

FGe₃₀: dosis plena

Nefrotoxicidad

-**Síndrome de diferenciación** que cursa con proliferación y diferenciación rápida de las células mieloides: leucocitosis no infecciosa, edema periférico, pirexia, disnea, derrame pleural, hipotensión, hipoxia, edema pulmonar, neumonitis, derrame pericárdico, erupción cutánea, sobrecarga de líquidos, SLT (IPT: 7,4%) y aumento de creatinina.
-Hipofosforemia e hipomagnesemia: casos anecdóticos en ensayos clínicos.
-Nauseas (FT: 42%), diarrea (FT: 35%), vómitos (FT: 23%).

Plan